

Gilson Alejandro Quinde Cabrera

César Moltó Esteve

**Tipología y cronología del abuso en la infancia y
percepción de la salud en personas con intento de
suicidio**

TREBALL DE FI DE GRAU

Dirigit pel Dr. José Alfonso Gutiérrez Zotes

Grau de Medicina



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Reus

2025

Resumen:

Introducción. El maltrato infantil se asocia con un mayor riesgo de trastornos mentales, una peor calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y tentativa suicida. Pese a ello, hasta la fecha hay poca literatura científica que analice cómo el tipo y el momento del maltrato durante un periodo sensible, afectan a la percepción de salud en personas con tentativa suicida. **Metodología.** El objetivo de nuestro estudio se basa en analizar la tipología y cronología del abuso en la infancia y percepción de la salud en personas con intento de suicidio. Se incluyeron 64 participantes atendidos después de un intento autolítico. Se utilizó la escala Escala de Cronología de la Exposición al Abuso y Maltrato (MACE) para evaluar el grado de exposición a diferentes tipos de maltrato y la escala EuroQol-5D para valorar la CVRS. Los participantes fueron clasificados en dos grupos según su puntuación media en CVRS. **Resultados.** Los resultados mostraron que el abuso sexual (SexAbs) y la Negligencia física (PN) se asociaron significativamente con una peor CVRS. También se identificaron tres periodos sensibles, a los 3 años, entre los 13 y 14, entre los 17 y 18 años. Además, la frecuencia de Maltrato Físico entre Pares (PeerPhys) mostró tendencia a la significación, pero no llegó a asumirla. **Conclusión.** En conclusión, tanto el tipo como el momento en el que se produce el maltrato tiene un impacto relevante en la calidad de salud de las personas con antecedentes de tentativa de suicidio. Estos hallazgos pueden ayudar al diseño de estrategias preventivas y terapéuticas más eficaces y enfocadas en los momentos críticos del desarrollo del ser.

Palabras claves: maltrato infantil, maltrato físico, periodos de sensibilidad, tentativa de suicidio, calidad de salud, MACE.

Abstract

Introduction. Childhood abuse is associated with an increased risk of mental disorders, poorer health-related quality of life (HRQoL), and suicide attempts. However, to date, there is little scientific literature analyzing how the type and timing of abuse during a sensitive period affect self-reported health in people who have attempted suicide.

Methodology. The objective of our study was to analyze the relationship between the type of child abuse and the timing of the abuse in relation to self-reported health quality of life in adults who have attempted suicide. We included 64 psychiatric participants treated after a suicide attempt. The MACE scale was used to assess the degree of exposure to different types of abuse, and the EuroQoL-5D scale was used to evaluate HRQoL. Participants were classified into two groups according to their mean HRQoL score.

Results. The results showed that sexual abuse (SexAbs) and physical neglect (PN) were significantly associated with poorer HRQoL. Three sensitive periods were also identified: at age 3, between ages 13 and 14, and between ages 17 and 18. Furthermore, the frequency of Peer Physical Abuse (PeerPhys) showed a tendency, but it did not reach significance.

Conclusion. In conclusion, both the type and timing of abuse have a significant impact on the quality of health of individuals with a history of suicide attempts. These findings may help design more effective preventive and therapeutic strategies focused on critical moments in a person's development.

Key-words: child maltreatment, physical maltreatment, sensitive periods, suicide attempt, quality of health, MACE.

Contacto:

Dr. Alfonso Gutiérrez Zotes: gutierrez@peremata.com

Estudiante Gilson Alejandro Quinde Cabrera: gilson.quinde@estudiants.urv.cat

Estudiante César Moltó Esteve: cesar.molto@estudiants.urv.cat